



### Virtsanäyte irtosolututkimusta varten (U -Syto)

Virtsanäytteestä tutkitaan virtsaan erittyviä soluja ja niiden solumuutoksia. Näytteen huonon säilyvyyden vuoksi, näyte suositellaan otettavaksi laboratoriossa.

**Näyte** Ota näytteeksi alle kaksi (2) tuntia rakossa ollutta virtsaa. Voit juoda vettä tai virvoitusjuomia näytteenoton helpottamiseksi. Jos tutkimus on pyydetty ottamaan useamman kerran, ota näytteet peräkkäisinä päivinä.

#### Näytteenotto

Pese kädet.

**Naiset:** Jos sinulla on kuukautiset tai runsasta valkovuotoa, aseta tamponi emättimeen näytteenoton ajaksi. Levitä häpyhuulet erilleen.

**Miehet:** Vedä esinahka taaksepäin.

Tee tämän jälkeen alapesu pelkällä vedellä. Kuivaa virtsaputken suu hyvin paperilla.

Laske alkuvirtsa hukkaan WC-altaaseen ja ota virtsasuihkun keski- ja loppuosa näytepurkkiin.

Jos otat näytteen muualla kuin laboratoriossa, ota näyte laboratorion hyväksymään näyteastiaan. Kirjoita nimesi sekä henkilötunnuksesi liimalappuun ja liimaa se näytepurkkiin. Toimita näyte välittömästi laboratorioon.

#### Yhteystiedot

Jos Sinulla on tästä kokeesta kysyttävää, voit soittaa arkisin numeroon 03-629 2273.