

KHKS
Kliininen laboratorio
Hämeenlinna

VUOROKAUSIVIRTSAKERÄYKSEN POTILASOHJEESEEN LIITETTÄVÄT LISÄOHJETARRAT

tulosta tarrapaperille 104 x 74

dU-Adr, dU-Noradr

Vältettävä lääkkeitä (esim. adrenaliini, noradrenaliini, MAO-estäjät) 3 vrk ennen keräystä ja sen aikana.

Lääkkeiden käytön keskeyttäminen on tapahduttava kuitenkin lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Potilaan tulee välttää banaanin, kahvin ja teen nauttimista keräyksen aikana.

dU-Aldos

Potilaan olisi syytä keskeyttää seuraavat lääkkeet ennen näyteenottoa: Estrogeenit, kortisoni, spironolaktoni, ja triamtreeni kuukaudeksi, ACE – estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat, reniinin estäjät, diureetit, sympatolyytit ja beetaslapaajat viikoksi.

Lääkkeiden käytön keskeyttäminen on tapahduttava kuitenkin lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Ruokavalio tulisi olla standardoitu suolan suhteen 3 – 5 vrk:n ajan: natriumin saanti naisilla korkeintaan 2.4 g/vrk, miehillä 2.8 g/vrk. Kaliumin saanti naisilla vähintään 3.1 g/vrk, miehillä 3.5 g/vrk.

dU-DALA, dU-PBG, dU-Porf

Näyte on suojattava valolta.

dU-5HIAA

Potilaan tulisi olla ilman serotoniiniaineenvaihduntaan vaikuttavaa lääkitystä 3 vrk ennen keräystä ja välttää 3 vrk ennen ja keräyksen aikana nauttimasta ananasta, banaania, pähkinöitä, tomaattia ja punaviiniä.

Lääkkeiden käytön keskeyttäminen on tapahduttava kuitenkin lääkärin ohjeiden mukaisesti.

U-HOP

Vähäkollageeninen dieetti: potilas ei saa nauttia lihaa, kalaa eikä liivatetta 1 vrk ennen keräystä eikä sen aikana.

dU-Oksal

Potilaan tulee välttää pinaattia, pippuria, raparperia ja teetä keräyksen aikana.

Virtsakeräyksen säilytys huoneenlämmössä.

dU-Pregnt

Potilaan tulee lopettaa lääkkeiden käyttö mahdollisuuksien mukaan 5 vrk ennen keräystä.

Lääkkeiden käytön keskeyttäminen on tapahduttava kuitenkin lääkärin ohjeiden mukaisesti.

KHKS
Kliininen laboratorio
Hämeenlinna

VUOROKAUSIVIRTSAKERÄYKSEN POTILASOHJEESEEN LIITETTÄVÄT LISÄOHJETARRAT

tulosta tarrapaperille 104 x 74

dU-HVA, dU-MetNor, dU-MOMA

Potilaan tulee välttää lääkkeitä 3 vrk ennen keräystä ja sen aikana (useat eri lääkeaineet saattavat häiritä määrittystä, katso tarkemmin Yhtyneet Medix laboratoriot -ohjekirja / Metanefriinit).

Lääkkeiden käytön keskeyttäminen on tapahduttava kuitenkin lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Potilaan tulee välttää banaanin, kahvin, teen ja alkoholin nauttimista sekä tupakointia keräyksen aikana.