

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Ohje vena spermatica -tutkimukseen tulevalle potilaalle (kiveslaskimoiden verenkiertotutkimus)

Tutkimus suoritetaan sairaalaan tulopäivänä ja kotiin pääsette samana päivänä. Esilääkityksen vuoksi autolla ajo on kielletty tutkimuspäivänä, joten teidän on järjestettävä kuljetus kotiin sairaalasta esimerkiksi taksilla.

Ennen tutkimusta

Jos käytätte **verenhennuslääkettä** (esim. Marevan), Teidän on lopetettava lääkkeen ottaminen kolme vuorokautta ennen sairaalaan tulopäivää, **mutta asiasta on neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa.**

Jos käytätte metformiinia sisältävää sokeritautilääkettä (tabletti), on lääkityksessä aloitettava tauko 2 vuorokautta ennen tutkimusta ja lääkitystaukoa on jatkettava vielä 2 vuorokautta tutkimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm.

Competact	Komboglyze	Oramet hexal
Diformin retard	Metforem	Synjardy
Eucreas	Metformin actavis	Velmetia
Glucophage	Metformin stada	Vipdomet
Janumet	Metformin vitabalans	Xigduo
Jentadueto	Oramet	

Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle tai puudutusaineille, ottakaa yhteyttä Teille kutsun lähettäneeseen osastoon.

Teidän on käytävä etukäteen (viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä) verikokeissa sekä tarvittaessa keuhkokuvassa.

Tutkimusta edeltävänä iltana Teidän tulee käydä suihkussa.

Tutkimuspäivänä

Tutkimuspäivänä Teidän tulee olla syömättä ja juomatta. Muut henkilökohtaiset lääkkeet saatte ottaa aamulla pienen vesitiikan kanssa. Ilmoittautukaa päiväsairaalassa. Tutkimuspäivän aamuna nivustaipeiden ihokarvat leikataan, iho pestään ja annetaan esilääkkeet.

Teidät viedään sängyllä röntgenosastolle. Röntgenlääkäri puuduttaa nivustaipeen ihoa. Läpivalaisun avulla lääkäri ohjaa ohuen muoviletkun (katetrin) tutkittavaan suoneen. Katetrin kautta laitetaan varjoainetta ja samalla otetaan röntgenkuvia. Tarvittaessa tutkimuksen yhteydessä tehdään korjaava toimenpide.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun