

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Ohje angiografiaan eli verisuonien varjoainekuvaukseen *edeltävänä päivänä* osastolle tulevalle potilaalle

Tutkimus suoritetaan seuraavana päivänä ja kotiin pääsette lähtemään joko tutkimuspäivänä tai viimeistään seuraavana päivänä tutkimuksesta.

Valmistautuminen tutkimukseen

Juokaa runsaasti nesteitä. Tutkimuksessa käytetään varjoainetta, joka poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Runsas juominen nopeuttaa varjoaineen poistumista.

Neuvotelkaa Teitä hoitavan lääkärin kanssa, jos käytätte verenohennuslääkkeitä (esim. Marevan). Marevan-lääkitys on yleensä tauotettava kolme vuorokautta ennen tutkimusta.

Jos käytätte metformiinia sisältävää sokeritautilääkettä (tabletti), on lääkityksessä aloitettava tauko 2 vuorokautta ennen tutkimusta ja lääkitystaukoa on jatkettava vielä 2 vuorokautta tutkimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm.

| | | |
|-----------------|----------------------|--------------|
| Competact | Komboglyze | Oramet hexal |
| Diformin retard | Metforem | Synjardy |
| Eucreas | Metformin actavis | Velmetia |
| Glucophage | Metformin stada | Vipdomet |
| Janumet | Metformin vitabalans | Xigduo |
| Jentadueto | Oramet | |

Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle tai puudutusaineille, ottakaa yhteys osastoon 5B.

Jos epäilette tai tiedätte olevanne raskaana, ottakaa yhteys osastoon 5B.

Tutkimuspäivänä

Tutkimuspäivän aamuna olette ravinnotta.

Teidät viedään sängyllä röntgenosastolle. Tutkimuksen aikana Teidän tulisi olla selinmakuulla liikkumatta tutkimuspöydällä. Röntgenlääkäri puuduttaa nivustaipeen ihoa, tekee piston valtimoon ja vie kuvauskatetrin suoneen. Katetrin kautta ruiskutetaan varjoainetta, jolloin valtimot saadaan näkyviin.

Tutkimus kestää 1-2 tuntia.

Tutkimuksen jälkeen katetri otetaan pois. Punktiokohtaan laitetaan sulkulaite tai nivustaipeetta painetaan voimakkaasti käsin vuodon tyrehtyttämiseksi. Tarvittaessa nivusen päälle laitetaan hiekkapussi 1–3 tunnin ajaksi. Olette vuodepotilaana 2–5 tuntia tai seuraavaan aamuun.

Hoitohenkilökunta kertoo milloin saatte syödä ja juoda. Varjoaineen annon jälkeen Teidän on hyvä juoda runsaasti nestettä. Juominen edistää varjoaineen poistumista.

Kotona

Teidän on hyvä välttää raskaiden taakkojen nostelua, kovaa liikuntaa, saunomista ja suihkuttamista pitkään kuumalla vedellä kolmen vuorokauden ajan.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun. **Yhteystiedot: Osasto 5B puh. 03 629 2544**