

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

## Ohje angiografiaan eli verisuonien varjoainekuvaukseen tulevalle potilaalle

Tutkimus suoritetaan sairaalaan tulopäivänä ja kotiin pääsette lähtemään joko samana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä tutkimuksesta.

### Valmistautuminen tutkimukseen

Juokaa runsaasti nesteitä. Tutkimuksessa käytetään varjoainetta, joka poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Runsas juominen nopeuttaa varjoaineen poistumista.

Neuvotelkaa Teitä hoitavan lääkärin kanssa, jos käytätte verenohennuslääkkeitä (esim. Marevan). Marevan-lääkitys on yleensä tauotettava kolme vuorokautta ennen tutkimusta.

Jos käytätte metformiinia sisältävää sokeritautilääkettä (tabletti), on lääkityksessä aloitettava tauko 2 vuorokautta ennen tutkimusta ja lääkitystaukoa on jatkettava vielä 2 vuorokautta tutkimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm.

|                 |                      |              |
|-----------------|----------------------|--------------|
| Competact       | Komboglyze           | Oramet hexal |
| Diformin retard | Metforem             | Synjardy     |
| Eucreas         | Metformin actavis    | Velmetia     |
| Glucophage      | Metformin stada      | Vipdomet     |
| Janumet         | Metformin vitabalans | Xigduo       |
| Jentaduetto     | Oramet               |              |

Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle tai puudutusaineille tai jos epäilette tai tiedätte olevanne raskaana, ottakaa yhteys osastoon 5B.

Käykää Teille määrätyissä laboratoriotesteissä saamanne ohjeen mukaisesti.

### Tutkimuspäivän aamuna

Jos käytätte nesteenpoistolääkkeitä, jättäkää ne ottamatta. Muut lääkkeet, joita ei ole edellä mainittu, voitte ottaa normaalisti pienen vesimäärän kanssa.

**Jos olette insuliinidiabeetikko, älkää pistäkö insuliineja toimenpideaamuna.**

Älkää syökö klo 02 jälkeen mitään, vettä saatte juoda vähän. Peseytykää huolellisesti. Tulkaa osastolle ajoissa.

### Tutkimuspäivänä

Teidät viedään sängyllä röntgenosastolle. Tutkimuksen aikana Teidän tulisi olla liikkumatta selinmakuulla tutkimuspöydällä. Röntgenlääkäri puuduttaa nivustaipen ihoa, tekee piston valtimoon ja vie kuvauskatetrin suoneen. Katetrin kautta ruiskutetaan varjoainetta, jolloin valtimot saadaan näkyviin. Tutkimus kestää 1-2 tuntia.

Tutkimuksen jälkeen katetri otetaan pois. Punktiokohtaan laitetaan sulkulaite tai nivustaivetta painetaan voimakkaasti käsin vuodon tyrehtyttämiseksi. Tarvittaessa nivusen päälle laitetaan hiekkapussi 1–3 tunnin ajaksi. Olette vuodepotilaana 3–5 tuntia tai seuraavaan aamuun. Hoitohenkilökunta kertoo milloin saatte syödä ja juoda. Varjoaineen annon jälkeen Teidän on hyvä juoda runsaasti nestettä. Juominen edistää varjoaineen poistumista.

### Kotona

Teidän on hyvä välttää raskaiden taakkojen nostelua, kovaa liikuntaa, saunomista ja suihkutamista pitkään kuumalla vedellä kolmen vuorokauden ajan. Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun. **Yhteystiedot: Osasto 5B puh. 03 629 2544**