

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Ohje urografiaan tulevalle potilaalle

Teille on varattu aika **virtsatteiden varjoainekuvaukseen eli urografiaan** Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosastolle

Ilmoittautukaa tullessanne **röntgenin** toimistoon, 1.kerros. Seuratkaa opasteita.

- Varatkaa aikaa tutkimukseen noin kaksi tuntia.
- Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle, ottakaa yhteyttä poliklinikalle.
- Jos Teillä on sokeritauti ja käytätte lääkityksenä metformiinia, on lääkityksessä aloitettava tauko 2 vuorokautta ennen tutkimusta ja lääkitystaukoa on jatkettava vielä 2 vuorokautta tutkimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm:

Competact	Komboglyze	Oramet hexal
Diformin retard	Metforem	Synjardy
Eucreas	Metformin actavis	Velmetia
Glucophage	Metformin stada	Vipdomet
Janumet	Metformin vitabalans	Xigduo
Jentadueto	Oramet	

- Muut säännöllisesti käyttämänne lääkkeet voitte ottaa normaalisti.
- Jos epäilette tai tiedätte olevanne raskaana, ottakaa yhteyttä poliklinikalle.
- Jos imetätte, ottakaa edellisenä päivänä yhteyttä röntgenosastolle, puh. (03) 629 2078.
- **Noudattakaa huolellisesti oheista ruokavalio- ja tyhjennysohjetta**, koska se on tärkeää tutkimuksen onnistumiseksi.
- Jos Teillä on diabetes, neuvotelkaa tarvittaessa ruokavaliosta ja lääkityksestä hoitavan lääkärinne kanssa.
- Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.

Tutkimusta edeltävänä päivänä

Noudattakaa kevyttä ja vähäkuituista ruokavaliota. Sallittuja ruoka-aineita ovat muun muassa:

- keitetty kala
- lihaliemi, mehukiisseli
- vaalea leipä (1–2 viipaletta)
- tee, musta kahvi
- runsaasti juotavaa (ei hiilihappopitoista)

Tyhjennyslääkkeet

- 2 Toilax®-tablettia klo 12.00
- 2 Toilax®-tablettia klo 22.00
- Tabletit niellään kokonaisina

Tutkimuspäivän aamuna ottakaa

- 1 Toilax®-peräruiske. Jos Teillä on taipumusta ummetukseen, noudattakaa näitä ohjeita **kahtena** tutkimusta edeltävänä päivänä.

Tutkimuspäivänä

Tutkimuspäivänä ennen tutkimusta ette saa syödä.

Juokaa vähintään 2–3 lasillista vettä.

Röntgenosastolla ruiskutetaan varjoainetta käsivarren laskimoon, josta se kulkeutuu munuaisiin ja sieltä virtsanjohtimia pitkin virtsarakkoon.

Tutkimuksen jälkeen saatte syödä ja juoda normaalisti. Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun.