

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Ohje colongrafiaan tulevalle potilaalle

Teille on varattu aika **paksusuolen varjoainekuvaukseen eli colongrafiaan** Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosastolle

Ilmoittautukaa tullessanne **röntgenin** toimistoon, 1.krs. Seuratkaa opasteita.

- Varatkaa aikaa tutkimukseen noin kaksi tuntia.
- Jos epäilette tai tiedätte olevanne raskaana, ottakaa yhteyttä poliklinikalle.
- Voitte ottaa säännöllisesti käyttämänne lääkkeit.
- Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.
- Jos sairastatte diabetesta, neuvotelkaa tyhjennyksestä hoitavan lääkäriinne tai K-HKS:n diabeteshoitajan puh. (03) 629 2880 kanssa.

Tyhjennysohjeet

Tutkimusta edeltävän viikon aikana ette saa syödä siemeniä sisältäviä marjoja, vihanneksia, hedelmiä eikä leipää, jossa on siemeniä.
Paksusuoli on tyhjennettävä kokonaan ennen tutkimusta, koska se on edellytys tutkimuksen onnistumiselle.

Tutkimuspäivää edeltävänä päivänä

Tutkimusta edeltävänä päivänä ette saa syödä kiinteää ruokaa. Vakituiset lääkkeet saatte ottaa.

Älkää käyttäkö maitotuotteita tai purukumia. Nauttikaa runsaasti kirkkaita nesteitä, joita ovat esimerkiksi lihaliemi, vesi, marja- ja hedelmämehu ilman hedelmälihaa, mehukeitto, virvoitusjuomat, urheilujuoma, tee ja kahvi ilman maitoa.

Klo 14 Lukekaa Picoprep-tyhjennyslääkkeen pakkausseloste ennen kuin aloitatte tyhjennyksen. Sekoittakaa ensimmäinen pussi Picoprep-jauhetta lasilliseen (= n.150 ml) kylmää vettä. Sekoitakaa 2–3 minuutin ajan. Neste voi joskus kuumentua, kun Picoprep liukenee. Jos näin tapahtuu, juokaa neste vasta, kun se on jäähtynyt juomalämpöiseksi. Juokaa lisäksi 2 lasillista (à 250 ml) kirkkaita nesteitä. Siitä eteenpäin juokaa kirkkaita nesteitä vähintään yksi lasillinen joka tunti kunnes Picoprepin vaikutus loppuu. Pahoinvointia, vatsan turvotusta tai kouristelevaa kipua saattaa esiintyä ohimenevästi.

Klo 20 Valmistakaa toinen annos Picoprep-liuosta sekoittamalla jauhepussi lasilliseen (= 150 ml) kylmää vettä ja juokaa se. Juokaa lisäksi 2 lasillista (à 250 ml) kirkkaita nesteitä. Siitä eteenpäin (nukkumaan menoon asti) juokaa kirkkaita nesteitä vähintään yksi lasillinen joka tunti kunnes Picoprepin vaikutus loppuu.

Tutkimuspäivänä

Tutkimuksessa paksusuoleen laitetaan peräruiskeena varjoainetta ja ilmaa. Näin saadaan suolen rakenne näkyviin.

Tutkimuksen jälkeen saatte syödä ja juoda normaalisti

Huomioitavaa

Huolehdiä tyhjennyksen aikana riittävästä kalorimäärästä juomalla energiapitoisia kirkkaita nesteitä.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun.