

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Ohje laskimoiden varjoainekuvaukseen tulevalle potilaalle

Teille on varattu aika **laskimoiden varjoainekuvaukseen eli venografiaan** Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosastolle

Ilmoittautukaa tullessanne **röntgenin** toimistoon, 1.kerros. Seuratkaa opasteita.

- Varatkaa aikaa tutkimukseen noin kaksi tuntia.
- Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle, ottakaa yhteyttä poliklinikalle.
- Jos Teillä on sokeritauti ja käytätte lääkityksenä metformiinia, on lääkityksessä aloitettava tauko 2 vuorokautta ennen tutkimusta ja lääkitystaukoa on jatkettava vielä 2 vuorokautta tutkimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm.

Competact	Komboglyze	Oramet hexal
Diformin retard	Metforem	Synjardy
Eucreas	Metformin actavis	Velmetia
Glucophage	Metformin stada	Vipdomet
Janumet	Metformin vitabalans	Xigduo
Jentadueto	Oramet	

- Muut säännöllisesti käyttämänne lääkkeet voitte ottaa normaalisti.
- Jos epäilette tai tiedätte olevanne raskaana, ottakaa yhteyttä poliklinikalle.
- Jos imetätte, ottakaa edellisenä päivänä yhteyttä röntgenosastolle, puh. (03) 629 2078.
- Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.

Tutkimuspäivänä

Röntgenosastolla ruiskutetaan varjoainetta jalkapöydän laskimoon. Tutkimuksessa kuvataan jalan syvät laskimot nilkasta nivustaipeeseen. Tutkimuksen jälkeen saatte syödä ja juoda normaalisti.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun.