

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Ohje hermojuuripuudutukseen tulevalle potilaalle

Teille on varattu aika **hermojuuripuudutukseen** Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosastolle

Ilmoittautukaa tullessanne **röntgenin** toimistoon, 1.kerros. Seuratkaa opasteita.

- Tutkimus ei vaadi esivalmisteluja. Ennen tutkimusta saa syödä ja juoda normaalisti.
- Varatkaa aikaa tutkimukseen ja jälkiseurantaan yhteensä noin neljä tuntia.
- Tutkimuksen jälkeen tutkimuspäivänä ei saa ajaa autoa.
- Jos epäilette tai tiedätte olevanne raskaana, ottakaa yhteyttä poliklinikalle.
- Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.

Tutkimuspäivänä

Tutkimuspäivän aamuna saatte ottaa Teille määrätyt aamulääkkeet. Jos liikkumatta makaaminen (yleensä vatsallaan) on Teille kivuliasta, ottakaa tarvittaessa kipulääkettä ennen tutkimusta (lukuun ottamatta ibuprofeeni, aspiriini tai primaspan). Jos käytätte verenhennuslääkitystä, se on lopetettava verenvuodon välttämiseksi hoitavan lääkärin antaman ohjeen mukaisesti.

Tutkimus tehdään paikallispuudutuksessa. Mahdollinen puuduteaineallergia on ilmoitettava ennen tutkimusta. Röntgenlääkäri ruiskuttaa oireita aiheuttavaan hermojuureen puudute-kortisoni -seoksen käyttäen apuna tietokonetomografia- tai läpivalaisulaitetta.

Ensimmäisellä kerralla Teille on varattu vuodepaikka päiväsairalaan tai vuodeosastolle kahden tunnin ajaksi jälkiseurantaa varten. Tämän jälkeen pääsette kotiin. Puudutetun puolen jalka saattaa olla heikompi/puutunut muutaman tunnin toimenpiteen jälkeen. Pitäkää pistokohta kuivana seuraavaan päivään asti.

Huomioitavaa

Jos Teillä on kotona nyt tutkittavalta alueelta röntgenkuvia tai lausuntoja, ottakaa ne mukaan tullessanne tutkimukseen.

- Tutkimus sisältyy poliklinikkamaksuun.
- Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun.

K-HKS 4577.05.18
SS,JA, SM/ur/TM