

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

## Ohje ohutsuolen tietokonetomografiatutkimukseen tulevalle potilaalle

Teille on varattu aika **ohutsuolen** tietokonetomografiatutkimukseen Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosastolle

**Saapukaa tuntia ennen tutkimusaikaa** röntgenosastolle tutkimuksen valmisteluja varten. Ilmoittautukaa tullessanne **röntgenin** toimistoon, 1.kerros. Seuratkaa opasteita.

- Jos epäilette tai tiedätte olevanne raskaana, ottakaa yhteyttä poliklinikalle.
- Jos imetätte, ottakaa edellisenä päivänä yhteyttä röntgenosastolle puhelin (03) 629 4583.
- Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle, ilmoittakaa siitä röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.
- Teille määrätyt verikokeet tulisi olla otettuna ennen tietokonetomografiatutkimusta.
- Olkaa ravinnotta tutkimuspäivän aamusta lähtien. Vettä saatte juoda vapaasti.
- Jos Teillä on sokeritauti ja käytätte lääkityksenä metformiinia, on lääkityksessä aloitettava tauko 2 vuorokautta ennen tutkimusta ja lääkitystaukoa on jatkettava vielä 2 vuorokautta tutkimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm.

Competact	Komboglyze	Oramet hexal
Diformin retard	Metforem	Synjardy
Eucreas	Metformin actavis	Velmetia
Glucophage	Metformin stada	Vipdomet
Janumet	Metformin vitabalans	Xigduo
Jentadueto	Oramet	

- Muut säännöllisesti käyttämänne lääkkeet voitte ottaa normaalisti.
- Jos Teillä on todettu glaukooma eli viherkaihi tai silmänpainetauti, kertokaa siitä röntgenhoitajalle ennen tutkimuksen alkua.
- Kiireelliset päivystystutkimukset saattavat muuttaa tutkimusjärjestystä, joten varautukaa siihen, että tutkimusaika saattaa olla hiukan myöhässä.
- Tietokonetomografiatutkimuksessa muodostuu kohteesta röntgensäteiden avulla leikekuvia. Tutkimus on kivuton. Tutkimuksen aikana Teidän tulee maata liikku-matta, koska liike aiheuttaa kuviin epätarkkuutta. Röntgenhoitajalla on Teihin puhe-, kuulo- ja näköyhteys.
- Kuvausta varten Teille annetaan juotavaksi Colonsteril- nimistä ainetta, joka voi aiheuttaa voimakasta suolen tyhjenemistä loppupäivän ajan.
- Usein tutkimuksessa annetaan jodipitoista varjoainetta käsivarren laskimoon kanyylin kautta. Varjoaine parantaa verisuonten ja eri kudosten näkyvyyttä. Varjoaine aiheuttaa ohimenevän lämmöntunteen ja joskus metallinmaun.
- Varjoaine ei ole este esim. autolla ajamiselle tai työhön takaisin palaamiselle.
- Tutkimuksen tuloksen kuulette Teitä hoitavalta lääkäriltä. Ottakaa yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli Teillä ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.
- Tutkimus sisältyy poliklinikkamaksuun.
- Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun.

K-HKS 4793 10:18  
SMu,JAJ/TM

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky. • 13530 Hämeenlinna • Puh. 03 6291

Hämeenlinnan yksikkö  
Ahenistontie 20  
13530 HÄMEENLINNA  
vaihte 03 6291

Riihimäen yksikkö  
Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI  
PL 140, 11101 RIIHIMÄKI  
vaihte 019 744 51

*Sinua kuunnellen*.....