

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

## Skleroterapia eli sisäelimen kystan alkoholihoito

Saapukaa osastolle sovittuna aikana.  
Toimenpiteessä röntgenlääkäri vie paikallisuudutuksessa ohuen katetrin kystaan ja ruiskuttaa siihen alkoholia. Alkoholin annetaan vaikuttaa n. 20 minuuttia.

### Valmistautuminen tutkimukseen

Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle tai puudutusaineille, tai epäilette olevanne ras-  
kaana, ottakaa yhteys lähettävään osastoon tai Teitä hoitavaan lääkäriin.

Neuvotelkaa Teitä hoitavan lääkärin kanssa, jos käytätte verenhennuslääkkeitä  
(esim. Marevan). Marevan-lääkitys on yleensä tauotettava kolme vuorokautta ennen  
tutkimusta. Käykää Teille määrätyissä laboratorikokeissa saamanne ohjeen mukai-  
sesti.

Ennen osastolle lähtöänne käykää suihkussa.

### Tutkimuspäivänä

Tutkimuspäivän aamuna (kello 00.00 alkaen) olkaa ravinnotta. Saatte ottaa aamulla  
henkilökohtaiset lääkkeenne (paitsi Marevan).  
Osastolla vaihdatte päällenne potilasvaatteet ja Teille laitetaan kanyyli käsivarren las-  
kimoon.

Teidät viedään sängyllä röntgenosastolle. Toimenpide tehdään röntgensäteilyä ja ult-  
raääntä apuna käyttäen. Saatte kipulääkettä tarpeen mukaan.

Toimenpide kestää n. 1-2 tuntia ja sen jälkeen siirrytte takaisin osastolle jälkiseur-  
taan. Teidän on oltava vuodelevossa 6 tuntia toimenpiteen jälkeen.

Hoitohenkilökunta kertoo milloin saatte syödä ja juoda.

Onnistuneessa skleroterapiassa kysta alkaa pienentyä 3 kk:ssa toimenpiteestä.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun.