

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Ohje kohdun ja munanjohtimien varjoainetutkimukseen eli

hysterosalpingografiaan (HSG) tulevalle potilaalle

Teille on varattu aika **kohdun ja munanjohtimien varjoainetutkimukseen** Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosastolle

Ilmoittautukaa tullessanne **röntgenin** toimistoon, 1.kerros. Seuratkaa opasteita.

- Varatkaa aikaa tutkimukseen noin tunti.
- Tutkimusta ei voi tehdä kuukautisvuodon aikana. Tutkimus tehdään viimeistään 10 päivän sisällä kuukautisten alkamisesta.
- Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle tai epäilette / tiedätte olevanne raskaana, ottaa yhteyttä poliklinikalle.
- Voitte ottaa säännöllisesti käyttämissäne lääkkeit. Saatte myös syödä ja juoda normaalisti ennen ja jälkeen tutkimuksen.
- Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.

Tutkimuspäivänä

Röntgenlääkäri ja gynekologi tekevät tutkimuksen. Gynekologi asettaa pienen katetrin kohtuonteloon ja ruiskuttaa jodipitoista varjoainetta katetrin kautta. Röntgenlääkäri kuvaa tutkittavan kohteen ja tulkitsee kuvat.

Tutkimuksen jälkeen voi esiintyä lievää veristä vuotoa ja kohdun supistelua. Vuorokausi tutkimuksen jälkeen on vältettävä infektiota vaaran vuoksi uintia, ammekylpyjä ja yhdyntää. Jos huomaatte tutkimuksen jälkeen voinnissanne jotain muuta normaalista poikkeavaa, niin ottakaa yhteys lähettävään yksikköön. Tutkimustulokset saatte hoitavalta lääkäriltä.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun.

K-HKS 4910.05.18
SMu,JA / TM