

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Ohje alavatsan tietokonetomografiatutkimukseen tulevalle potilaalle

Teille on varattu aika **tietokonetomografiatutkimukseen** Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosastolle

Saapukaa 15 min ennen tutkimusaikaa röntgenosastolle tutkimuksen valmisteluja varten.

Ilmoittautukaa tullessanne **röntgenin** toimistoon, 1.kerros. Seuratkaa opasteita.

- Jos epäilette tai tiedätte olevanne raskaana, ottakaa yhteyttä poliklinikalle.
- Jos imetätte, ottakaa edellisenä päivänä yhteyttä röntgenosastolle puhelin (03) 629 4583.
- Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle, ilmoittakaa siitä röntgenhoitajalle ennen tutkimusta.
- Teille määrättyt verikokeet tulisi olla otettuna ennen tietokonetomografiatutkimusta.
- Tutkimusta ennen olkaa 2 tuntia syömättä. Vettä saatte juoda vapaasti. Pyrkikää välttämään virtsaamista puolisen tuntia ennen tutkimusta, jotta rakossa olisi hiukan virtsaa tutkimuksen alkaessa.
- Jos Teillä on sokeritauti ja käytätte lääkityksenä metformiinia, on lääkityksessä aloitettava tauko 2 vuorokautta ennen tutkimusta ja lääkitystaukoa on jatkettava vielä 2 vuorokautta tutkimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm.

Competact	Komboglyze	Oramet hexal
Diformin retard	Metforem	Synjardy
Eucreas	Metformin actavis	Velmetia
Glucophage	Metformin stada	Vipdomet
Janumet	Metformin vitabalans	Xigduo
Jentadueto	Oramet	

- Muut säännöllisesti käyttämänne lääkkeet voitte ottaa normaalisti.
- Kiireelliset päivystystutkimukset saattavat muuttaa tutkimusjärjestystä, joten varautukaa siihen, että tutkimusaika saattaa olla hiukan myöhässä.
- Tietokonetomografiatutkimuksessa muodostuu kohteesta röntgensäteiden avulla leikekuvia. Tutkimus on kivuton. Tutkimuksen aikana Teidän tulee maata liikkumatta, koska liike aiheuttaa kuviin epätarkkuutta. Röntgenhoitajalla on Teihin puhe-, kuulo- ja näköyhteys
- Usein tutkimuksessa annetaan jodipitoista varjoainetta käsivarren laskimoon kanyylin kautta. Varjoaine parantaa verisuonten ja eri kudosten näkyvyyttä. Varjoaine aiheuttaa ohimenevän lämmöntunteen ja joskus metallinmaun.
- Varjoaine ei ole este esim. autolla ajamiselle tai työhön takaisin palaamiselle.
- Tutkimuksen tuloksen kuulette Teitä hoitavalta lääkäriltä. Ottakaa yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli Teillä ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.
- Tutkimus sisältyy poliklinikkamaksuun.
- Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun.

K-HKS 4983, 10.18
SMU, JAV TM