

## Potilasohje keuhkojen toimintakokeeseen tulevalle

Sinulle on varattu aika \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ klo \_\_\_\_ .

- spirometriaan  
 diffuusiokapasiteetin määrittämiseen

Tutkimus tehdään kliinisen fysiologian yksikössä. Ilmoittautukaa tullessanne **RÖNTGENIN** toimistoon, 1. kerros. Voitte saapua joko pääoven tai F1-oven kautta. Seuratkaa opasteita.

Saavuttehan tutkimukseen tuoksutta, ilman hajuvettä/partavettä.

### Tutkimuksen tarkoitus:

Tutkimuksien avulla voidaan selvittää keuhkojen toimintakykyä ja tilavuutta sekä hengityskaasujen (hapen ja hiilidioksidin) kulkeutumista keuhkojen ja verenkierron välillä. Tutkimus kestää ½ - 1 tuntia ja sen suorittaa hoitaja.

### Ennen tutkimusta huomioitavaa:

<b>4 tuntia</b>	Ei kahvia, teetä, kola/energiajuomia, eikä <b>raskasta</b> ateriaa
<b>2 tuntia</b>	Ei tupakkaa
<b>2 tuntia</b>	Vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta
<b>24 tuntia</b>	Ei alkoholia

### Äkilliset sairastumiset:

Tutkimusta ei voida tehdä luotettavasti hengitystietulehdusten aikana (kuume, flunssa, kurkkukipu, ym.), eikä kahteen viikkoon sen jälkeen. Sairaustapauksessa tai halutessanne vaihtaa tutkimus- tai poliklinikka-aikaa, ottakaa yhteys hoitavaan yksikköön.

### Lääkitys:

**LÄHETTÄVÄ LÄÄKÄRI PÄÄTTÄÄ** lääkityksestä: (Noudattakaa rastitettua ohjetta)

- Jatkakaa** käyttämäänne lääkitystä normaalisti ilman taukoa.
- Pitäkää ennen tutkimusta lääketauko.** Noudattakaa seuraavan sivun lääkelistalla mainittuja rajoituksia. Lääkkeitä, joita ei ole mainittu luettelossa, voitte käyttää normaalisti.

**Käännä ->**

**Diagnostisiin keuhkofunktio tutkimuksiin vaikuttavat lääkkeet:**

Accolate 3 vrk	Efedrina 12 vrk	Medrol 4 vkoa	<input type="checkbox"/> Seretide 2 vrk
Adrenalin, Epipen 12h	Efedriiniini 12 vrk	Montelukast 3 vrk	<input type="checkbox"/> Seretide 4 vkoa
Aerinaze 5 vrk	Eklira 2 vrk		Serevent 2 vrk
Airomir 12 h		Novopulmon 4 vkoa	Singulair 3 vrk
Alvesco 4 vkoa	Flixotide 4 vkoa		Solomet 4 vkoa *
Aminocont 3 vrk	<input type="checkbox"/> Flutiform 2 vrk	Onbrez 7 vrk	Spiriva 4 vrk
Anoro 3 vrk	<input type="checkbox"/> Flutiform 4 vkoa	Oxis 2 vrk	Srivasso 4 vrk
Asmanex 4 vkoa	<input type="checkbox"/> Fluticason 2 vrk		Striverdi 7 vrk
Atro dual 24 h	<input type="checkbox"/> Fluticason 4 vkoa	Prednisolon 4 vkoa*	<input type="checkbox"/> Symbicort 2 vrk
Atrovent 24 h	Fomeda 2 vrk	Prednison 4 vkoa *	<input type="checkbox"/> Symbicort 4 vkoa
Atrovent comp 24 h	Foradil 2 vrk	Pulmicort 4 vkoa	
	Formatris 2 vrk		Theofol 5 vrk
Beclomet 4 vkoa	Formaxa 2 vrk	<input type="checkbox"/> Relvar 3 vrk	Tilade 24 h
Bricanyl 12 h	Formoterol 2 vrk	<input type="checkbox"/> Relvar 4 vkoa	<input type="checkbox"/> Trelegy 3 vrk
Budesonid 4 vkoa		Retafyllin 3 vrk	<input type="checkbox"/> Trelegy 4 vkoa
Budesonide 4 vkoa	Hydrocortison 4 vkoa *		<input type="checkbox"/> Trimbrow 12 vrk
<input type="checkbox"/> Bufomix 2 vrk		Salbutamol 12 h	<input type="checkbox"/> Trimbrow 4 vkoa
<input type="checkbox"/> Bufomix 4 vkoa	<input type="checkbox"/> Innovair 2 vrk	<input type="checkbox"/> Salfumix 2 vrk	
Buventol 12 h	<input type="checkbox"/> Innovair 4 vkoa	<input type="checkbox"/> Salfumix 4 vkoa	Ultibro 24 h
	Incruse 3 vrk	<input type="checkbox"/> Salmeson 2 vrk	
Cycloterol 2 vrk	Inspiolto 7 vrk	<input type="checkbox"/> Salmeson 4 vkoa	Ventoline 12 h
	Ipramol 24 h	<input type="checkbox"/> Salmeterol 2 vrk	
Daxas 5 vrk	Ipraxa 24 h	<input type="checkbox"/> Salmeterol 4 vkoa	
Duakliir 2 vrk	Ipratropium/Salbutamol 24 h	Seebri 12 vrk	
Difenhydramine 5 vrk			

**KAIKKI YSKÄNLÄÄKKEET 3 VRK**

\* tauko vain, jos kuuluvat astman tai keuhkohtaumataudin (COPD) hoitoon