

Potilasohje metakoliinialtistuskokeeseen tulevalle

Sinulle on varattu aika ___ / ___20___ klo _____ keskussairaalan kliinisen fysiologian osastolle.

Ilmoittautukaa tullessanne **RÖNTGENIN** toimistoon, 1.kerros.
Voitte saapua joko pääoven tai F1-oven kautta. Seuratkaa opasteita.

Saavuttehan tutkimukseen tuoksutta, ilman hajuvettä/partavettä.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimus on osa astman selvittelyä ja tarkoituksena on selvittää keuhkoputkien supistumisherkkyyttä. Tutkimus kestää noin tunnin ja sen suorittaa hoitaja.

HUOM! Tutkimusta ei tehdä raskaana oleville eikä imettäville äideille. Tutkimuksen alaikäraja on 7 vuotta.

Valmistautuminen tutkimukseen

4 tuntia	Ei kahvia, teetä, kola- tai energiajuomia, eikä raskasta ateriaa
2 tuntia	Tupakoimatta
2 tuntia	Vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta
24 tuntia	Ei alkoholia

Äkilliset sairastumiset

Tutkimusta ei voida tehdä luotettavasti hengitystietulehdusten aikana (kuume, flunssa, kurkkukipu, nuha), eikä kahteen viikkoon sen jälkeen. Sairaustapauksessa tai muutoin halutessanne vaihtaa tutkimusaikaa, ottakaa yhteys hoitavaan yksikköön.

Ohjeet lääkityksestä kääntöpuolella!

Käännä ->

Lääkitys Lähetävä lääkäri päättää lääkityksestä:

- Jatkakaa käyttämäänne lääkitystä normaalisti ilman taukoa.**
- Pitäkää ennen tutkimusta lääketauko.**

Kun halutaan tutkia keuhkojen toimintaa ilman lääkevaikutusta, tutkittavan pitää olla ilman seuraavia lääkkeitä vähintään alla mainittu aika.

Diagnostisiin keuhkofunktio tutkimuksiin vaikuttavat lääkkeet:

Accolate 3 vrk	Efedrina 12 vrk	Medrol 4 vkoa	<input type="checkbox"/> Seretide 2 vrk
Adrenalin, Epipen 12h	Efedriiniini 12 vrk	Montelukast 3 vrk	<input type="checkbox"/> Seretide 4 vkoa
Aerinaze 5 vrk	Eklira 2 vrk		Serevent 2 vrk
Airomir 12 h		Novopulmon 4 vkoa	Singulair 3 vrk
Alvesco 4 vkoa	Flixotide 4 vkoa		Solomet 4 vkoa *
Aminocont 3 vrk	<input type="checkbox"/> Flutiform 2 vrk	Onbrez 7 vrk	Spiriva 4 vrk
Anoro 3 vrk	<input type="checkbox"/> Flutiform 4 vkoa	Oxis 2 vrk	Srivasso 4 vrk
Asmanex 4 vkoa	<input type="checkbox"/> Fluticason 2 vrk		Striverdi 7 vrk
Atro dual 24 h	<input type="checkbox"/> Fluticason 4 vkoa	Prednisolon 4 vkoa *	<input type="checkbox"/> Symbicort 2 vrk
Atrovent 24 h	Fomeda 2 vrk	Prednison 4 vkoa *	<input type="checkbox"/> Symbicort 4 vkoa
Atrovent comp 24 h	Foradil 2 vrk	Pulmicort 4 vkoa	
	Formatris 2 vrk		Theofol 5 vrk
Beclomet 4 vkoa	Formaxa 2 vrk	<input type="checkbox"/> Relvar 3 vrk	Tilade 24 h
Bricanyl 12 h	Formoterol 2 vrk	<input type="checkbox"/> Relvar 4 vkoa	<input type="checkbox"/> Trelegy 3 vrk
Budesonid 4 vkoa		Retafyllin 3 vrk	<input type="checkbox"/> Trelegy 4 vkoa
Budesonide 4 vkoa	Hydrocortison 4 vkoa *		<input type="checkbox"/> Trimbrow 12 vrk
<input type="checkbox"/> Bufomix 2 vrk		Salbutamol 12 h	<input type="checkbox"/> Trimbrow 4 vkoa
<input type="checkbox"/> Bufomix 4 vkoa	<input type="checkbox"/> Innovair 2 vrk	<input type="checkbox"/> Salfumix 2 vrk	
Buventol 12 h	<input type="checkbox"/> Innovair 4 vkoa	<input type="checkbox"/> Salfumix 4 vkoa	Ultibro 24 h
	Incruse 3 vrk	<input type="checkbox"/> Salmeson 2 vrk	
Cycloterol 2 vrk	Inspiolto 7 vrk	<input type="checkbox"/> Salmeson 4 vkoa	Ventoline 12 h
	Ipramol 24 h	<input type="checkbox"/> Salmeterol 2 vrk	
Daxas 5 vrk	Ipraxa 24 h	<input type="checkbox"/> Salmeterol 4 vkoa	
Duaklir 2 vrk	Ipratropium/Salbutamol 24 h	Seebri 12 vrk	
Difenhydramine 5 vrk			

KAIKKI YSKÄNLÄÄKKEET 3 VRK

* tauko vain, jos kuuluvat astman tai keuhkohtaumataudin (COPD) hoitoon