

Sappihappojen imeytymistutkimukseen tulevalle

Sinulle on varattu ajat keskussairaalan klinisen fysiologian osaston isotooppi-laboratorioon, 1. kerros.

**Ilmoittaudu tullessanne RÖNTGENIN toimistoon, F- siipi, 1.kerros.
Saapua voit joko pääoven tai F1-oven kautta. Seuraa opasteita.**

Saavuthan tutkimukseen tuoksutta, ilman hajuvettä/partavettä!

Ensimmäinen tutkimuspäivä ____ . ____ . 201__ klo ____ : ____

Toinen tutkimuspäivä ____ . ____ . 201__ klo ____ : ____

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kroonisen ripulin syitä ja mahdollista sappihappojen imeytymishäiriötä. Radioaktiivinen tutkimusaine annetaan kapselina veden kanssa. **Mittaus suoritetaan gammakameralla 3 tunnin päästä kapselin otosta, sekä 7 päivän kuluttua.** Efekttiivinen säteilyannos on n. 0,26 mSv vastaten 1 kk:n altistumista luonnon taustasäteilylle.

Raskaus on este tutkimuksen suorittamiselle.

Valmistautuminen tutkimukseen

Ennen tutkimusta saat syödä ja juoda normaalisti.

Lääkitys

Tauottettavat: Questran, Colestid, Lestid

- 2 vrk ennen tutkimusta
- mittausten välinen aika 7 vrk
- yhteensä siis 9 vrk

Äkilliset sairastumiset

Sairastapauksessa tai jos haluat vaihtaa tutkimus- tai poliklinikka-aikaa, **ota yhteys Sinua hoitavaan osastoon tai poliklinikkaan.**

HUOM! Jos Sinulla on **suunnitelmassa ulkomaanmatka**, joka alkaa lähipäivinä radioaktiivisen kapselin annon jälkeen, **kysy isotooppihenkilökunnalta matkarajoituksista.**

Opastus sisäänkäyntiin www.khshp.fi → (Yhteystiedot → Kartta Hämeenlinnan yksikkö)