

Hämeenlinnan yksikkö/ Kliininen fysiologia 03-629 2154

## Potilasohje ruokatorven paineenmittaukseen tulevalle

Sinulle on varattu aika \_\_\_\_/\_\_\_\_20\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_ keskussairaalan kliinisen fysiologian osastolle.

Ilmoittaudu tullessasi **RÖNTGENIN** toimistoon, 1.kerros. Voit saapua joko pääoven tai F1-oven kautta. Seuraa opasteita.

**Saavuthan tutkimukseen tuoksutta, ilman hajuvettä/partavettä.**

### Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksella selvitetään ruokatorviperäisiä vaivoja, joista tavallisimpia ovat närästys, rintakivut, ylämahakivut ja toisinaan myös hengitystieoireet.

Tutkimus kestää ½ -1 tuntia. Ruokatorveen laitetaan nenän kautta muovikatetri, joka rekisteröi ruokatorven toimintaa sekä lepotilassa että nielaisujen yhteydessä.

### Ennen tutkimusta huomioitavaa

Ennen tutkimukseen tuloa Sinun tulee olla 4 tuntia syömättä ja juomatta.

### Lääkitys

Ruokatorven toimintaan vaikuttavassa lääkityksessä (**Prepulsid**) tulee pitää vähintään **2 vrk:n tauko**. Muut lääkkeet voit ottaa normaalisti 4 tunnin paasto huomioiden. Mikäli Sinulle tehdään samassa yhteydessä ruokatorven pH:n pitkäaikaisrekisteröinti, noudata siihen annettua lääketaukoa.

### Äkilliset sairastumiset

Tutkimusta ei voida tehdä tulehdussairauden aikana (kuume, flunssa, kurkkukipu, ym.) eikä mahataudin (oksentelu, äkillinen ripulitauti jne.) aikana. Terveytymisestä tulee olla vähintään viikko.

Sairaustapauksessa tai halutessasi vaihtaa tutkimus- tai poliklinikka-aikaa, ota yhteys Sinua hoitavaan osastoon tai poliklinikkaan.