

Potilasohje/ Sairaalahygienia

13.11.2020

## Pernanpoistopotilaiden rokotukset aikuisille

Pernan poiston jälkeen riski sairastua kapselillisten bakteerien aiheuttamiin vakaviin infektioihin kasvaa. Näille potilaille suositellaan annettava vaksi – mielellään ennen pernan poistoa – pneumokokki-, meningokokki- ja hemofiilusrokotteet. Jotta rokotteiden saaminen varmistuisi ja niiden antaminen olisi yhdenmukaista, ehdotan seuraavaa menettelyä:

### Elektiivinen pernanpoisto

(potilas tulee sovitusti leikkaukseen, jossa varmasti tai todennäköisesti poistetaan perna): Jos leikkauspäätös tehdään poliklinikalla, rokotteet annetaan käynnin yhteydessä. Jos leikkauspäätös tehdään osastolla, rokotteet annetaan osastojakson yhteydessä, ennen leikkaukseen tuloa.

### Päivystysluonteinen pernanpoisto (traumat yms.):

Rokotteet annetaan osastolla operaation jälkeen, esimerkiksi kotiutus-päivän aamuna.

### Rokotteiden tilaaminen

**Rokotteet tilataan sairaala-apteekista ja tilaukseen merkitään ”pernanpoistopotilas”.** Toimitettavan rokotteen kauppanimi voi vaihdella rokotteiden saatavuudesta riippuen. Rokotteet voi antaa myös gravidalle sekä immunosuprimoidulle henkilölle.

Rokotukset näitä tauteja vastaan katsotaan hyväksi hoidoksi, jolloin niiden kustantamisesta vastaa hoitoyksikkö. Elokuusta 2020 lähtien pernanpoistopotilaat ovat saaneet meningokokkirokotteet maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa.

**Mikäli kyseessä on lapsi tai henkilö on jo saanut osan suositelluista rokotuksista, katso tarkemmat ohjeet THL:n suosituksista: Pernanpoistopotilaiden rokottaminen**

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPUIRIN KY

Janne Mikkola  
Infektiolääkäri

Liitteet

Annettavat rokotukset – listaus (Annetaan potilaalle mukaan)

PA/JM KHKS  
4079 . 11.20

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky. • 13530 Hämeenlinna • Puh. 03 6291

Hämeenlinnan yksikkö  
Ahvenistontie 20  
13530 HÄMEENLINNA  
vaihte 03 6291

Riihimäen yksikkö  
Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI  
PL 140, 11101 RIIHIMÄKI  
vaihte 019 744 51

*Sinua kuunnellen*.....

**Pernan poistoa ennen tai poiston jälkeen annettavat rokotukset:**

**Prevenar®** (pneumokokkirokote, 0.5 ml) i.m. oikeaan olkavarteeseen

**Nimenrix®** (meningokokki ACWY -rokote, 0.5ml) i.m. oikeaan olkavarteeseen eri kohtaan

**Bexsero®** (meningokokki B –rokote 0,5 ml) i.m. vasempaan olkavarteeseen

**Act-Hib® tai Hiberix®** (hemofiilusrokote, 0.5ml) i.m. vasempaan olkavarteeseen eri kohtaan

**Aikaisintaan 2 kk ensimmäisestä rokotuksesta:**

**Pneumovax®** (23-valenttinen pneumokokkirokote) im. oikeaan olkavarteeseen

**Nimenrix®** (meningokokki ACWY -rokote, 0.5ml) i.m. oikeaan olkavarteeseen eri kohtaan

**Bexsero®** (meningokokki B –rokote 0,5 ml) i.m. vasempaan olkavarteeseen

Pernanpoistopotilaat saavat meningokokkirokotteet maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa.

**Tehosteannokset**

**Pneumovax®** tehosteannos viiden vuoden välein.

**Nimenrix®** tehosteannos viiden vuoden välein.

**Bexsero®** tehosteannoksen tarvetta ja ajoitusta ei ole vielä määritetty, suositus annetaan tutkimustiedon kertyessä.

Hemofiilusrokotusta ei tarvitse tehostaa.

**Rokotukset näitä tauteja vastaan  
katsotaan hyväksi hoidoksi,  
jolloin niiden kustantamisesta  
vastaa hoitoyksikkö!**

**Muut****Influenssa**

Pernan poisto tai toimimattomuus ei varsinaisesti vaikuta viruspuolustukseen. Influenssarokote kannattaa kuitenkin ottaa, sillä influenssan jälkitauteina saadaan herkästi bakteeritulehduksia. Pernanpoistopotilaalle ja lähipiirille kuuluu kansallisen rokotusohjelman influenssarokote, joka on maksuton.

Pernanpoistopotilaille voidaan antaa turvallisesti myös eläviä heikennettyjä rokotteita, jos henkilöllä ei ole muuta vasta-aihetta kyseiselle rokotteelle.