

Kilpirauhasen gammakuvaus

Sinulle on varattu aika _____ / _____ 20_____ klo _____ keskussairaalan kliinisen fysiologian osaston isotooppilaboratorioon, 1. kerros.

**Ilmoittaudu tullessasi RÖNTGENIN toimistoon, F- siipi, 1.kerros.
Saapua voit joko pääoven tai F1-oven kautta. Seuraa opasteita.**

Saavuthan tutkimukseen tuoksutta, ilman hajuvettä/partavettä!

Radioaktiivinen tutkimusaine annetaan yläraajan laskimoon. Kuvaus suoritetaan noin 30 minuutin kuluttua tutkimusaineen annosta ja se kestää n.30 minuuttia. Tutkimuksen kokonaiskesto on noin tunti. Efektiivinen säteilyannos on 1 mSv vastaten noin 4 kuukauden altistumista luonnonsäteilylle.

Mahdollinen **raskaus estää tutkimuksen** suorittamisen. Imettävien äitien suositellaan pitävän **12 tunnin imetystauko tutkimuksen jälkeen.**

Valmistautuminen tutkimukseen

Esivalmisteluja ei tarvita.

Lääkitys

Kilpirauhasen **liikatoiminnan** hoitoon käytettävät lääkkeet (Tyrazol) tulisi lopettaa 2 vuorokautta ennen kuvausta.
Kilpirauhasen **vajaatoimintaan** käytettävä kilpirauhashormonivalmiste (Thyroxin) on lopetettava vähintään 2 viikkoa ennen kuvausta.

Lääkehoito jatkuu taas normaalisti tutkimuksen jälkeen.

Äkilliset sairastumiset

Sairaustapauksessa tai halutessasi vaihtaa tutkimus- tai poliklinikka-aikaa, **ota yhteys Sinua hoitavaan osastoon tai poliklinikkaan.**

HUOM! Jos Sinulla on **suunnitelmissa ulkomaanmatka**, se voi alkaa **3 vuorokauden päästä tutkimuksesta**. Muussa tapauksessa tarvitset todistuksen saamastasi radioaktiivisuudesta rajaselvitystä varten.

Opastus sisäänkäyntiin www.khshp.fi → (Yhteystiedot → Kartta Hämeenlinnan yksikkö)