

Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus

Sinulle on varattu aika ____/____20____ klo ____ keskussairaalan kliinisen fysiologian osaston isotooppilaboratorioon.

Ilmoittaudu tullessasi RÖNTGENIN toimistoon, F- siipi, 1.kerros. Saapua voit joko pääoven tai F1-oven kautta. Seuraa opasteita.

Saavuthan tutkimukseen tuoksutta, ilman hajuvettä/partavettä!

Tutkimuksessa selvitetään onko sydämessä väliseinämäaukkoja, jotka aiheuttavat oikovirtausta ja arvioidaan oikovirtauksen suuruus.

Ennen tutkimusta saat suun kautta kaliumperkloraattipulveria, joka suojaa kilpirauhas- ta. Tutkimuksessa annetaan käden laskimoon radioaktiivista lääkeainetta, jonka kul- keutumista sydämeen ja keuhkoihin seurataan gammakameralla. Varatkaa aikaa tut- kimukseen noin 45 minuuttia. Efektiivinen säteilyannos on 5 mSv vastaten n.1 vuo- den ja 8 kk altistumista luonnonsäteilylle.

Raskaus ja imetys estävät tutkimuksen.

Valmistautuminen tutkimukseen

Tutkimuspäivänä saa syödä ja juoda normaalisti.
Varaa aikaa tutkimukseen noin 1 h.

Lääkitys

Voit käyttää normaalia lääkitystäsi, ellei hoitava lääkärisi ole toisin määrännyt.

Tärkeää huomioitavaa

Tutkimuksen jälkeen tulisi juoda tavallista runsaammin nestettä.
Virtsarakko on syytä tyhjentää usein tutkimuksen jälkeen.

Äkilliset sairastumiset

Sairastapauksessa tai halutessanne vaihtaa tutkimus- tai poliklinikka-aikaa, **ottakaa yhteys sinua hoitavaan osastoon tai poliklinikkaan.**