

Hämeenlinnan yksikkö / röntgenosasto

## Hoito-ohje rinnan paksuneulabiopsian jälkeen

Sinulta on otettu paksuneulanäyte rinnasta.

Näytteenottopäivänä on hyvä olla rauhallisesti, et saa tehdä raskasta työtä, nostella painavia tavaroita tai urheilla.

Näytteenottoaika saattaa kipeytyä. Voit hoitaa pistokohtaa kylmävillillä ja tarvittaessa voit ottaa särkylääkkeeksi parasetamolia (paratabs, panadol), mutta ibuprofeeniä (burana) tai asperiiniä ei saa ottaa. Pistopaikkaa ei saa kastella vuorokautteen ja saunominen on näytteenottopäivänä kielletty.

Mikäli sinulle tulee hengenahdistusta, rinta alkaa voimakkaasti punoittaa, siihen muodostuu turvotusta tai kipu lisääntyy merkittävästi, **ota tämä potilasohje mukaan ja mene ensiapuun.**

Potilaan nimi: \_\_\_\_\_

Potilaan henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Tutkimuksen päivämäärä: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ klo:\_\_\_\_:\_\_\_\_

Näytteenottoaika: \_\_\_\_\_

Puudutusaine ja -määrä: \_\_\_\_\_