

Hämeenlinnan yksikkö, Röntgenosasto

## Kotihoito-ohje sisäelimen/keuhkon paksuneulanäytteen jälkeen

Teiltä on otettu paksuneulanäyte \_\_\_\_\_.

Näytteenoton jälkeen teidän tulee välttää fyysistä rasitusta 3-4 vuorokauden ajan, kuten

- kaikenlaista urheilua
- painavien esineiden nostelua, ei edes kauppakassin kantamista
- siivoamista
- puutarha- ja maataloustöiden tekoa

Pistopaikkaa ei saa kastella ja saunominen on kielletty näytteenottopäivänä.

Näytteenottopaikka saattaa kipeytyä. Voitte hoitaa pistokohtaa kylmäpussilla. Tarvittaessa voitte ottaa särkylääkkeeksi parasetamolia, esim. paratabs, panadol. (Ei ibuprofeinia kuten burana, ibumax eikä asperiinia).

Mikäli pistopaikka alkaa voimakkaasti punoittaa, siihen muodostuu turvotusta tai kipu lisääntyy merkittävästi, ottakaa yhteyttä lähettävään tahoon tai ensiapuun.

Jos teiltä on otettu keuhkoista näyte ja teille tulee hengenahdistusta tai lisääntyvää yskää ottakaa yhteyttä lähettävään tahoon tai ensiapuun.

Potilaan nimi: \_\_\_\_\_

Potilaan henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Tutkimuspäivä: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_

Näytteenottopaikka: \_\_\_\_\_

Puudutusaine ja – määrä: \_\_\_\_\_