

Infektioidentorjuntayksikkö

PERNANPOISTOPOTILAIEN ROKOTUKSET AIKUISILLE

Pernan poiston jälkeen riski sairastua kapselillisten bakteerien aiheuttamiin vakaviin infektioihin kasvaa. Näille potilaille suositellaan annettava vaksi – mielellään ennen pernan poistoa – pneumokokki-, meningokokki- ja hemofiilusrokotteet. Jotta rokotteiden saaminen varmistuisi ja niiden antaminen olisi yhdenmukaista, ehdotan seuraavaa menettelyä:

Elektiivinen pernanpoisto

(potilas tulee sovitusti leikkaukseen, jossa varmasti tai todennäköisesti poistetaan perna): Jos leikkauspäätös tehdään poliklinikalla, rokotteet annetaan käynnin yhteydessä. Jos leikkauspäätös tehdään osastolla, rokotteet annetaan osastojakson yhteydessä, ennen leikkaukseen tuloa.

Päivystysluonteinen pernanpoisto (traumat yms.):

Rokotteet annetaan osastolla operaation jälkeen, esimerkiksi kotiutuspäivän aamuna.

Rokotteiden tilaaminen

Rokotteet tilataan sairaala-apteekista ja tilaukseen merkitään ”pernanpoistopotilas”. Toimitettavan rokotteen kauppanimi voi vaihdella rokotteiden saatavuudesta riippuen. Rokotteet voi antaa myös gravidalle sekä immunosuprimoidulle henkilölle.

Rokotukset näitä tauteja vastaan katsotaan hyväksi hoidoksi, jolloin niiden kustantamisesta vastaa hoitoyksikkö. Elokuusta 2020 lähtien pernanpoistopotilaat ovat saaneet meningokokkirokotteet maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa.

Mikäli kyseessä on lapsi, tai henkilö on jo saanut osan suositelluista rokotuksista, katso tarkemmat ohjeet THL:n suosituksista: Pernanpoistopotilaiden rokottaminen

Janne Mikkola
Infektioylilääkäri

Liitteet

Annettavat rokotukset – listaus (Annetaan potilaalle mukaan)

KHKS 4079.11.20
PA/JM

Pernan poistoa ennen tai poiston jälkeen annettavat rokotukset:

Prevenar® (pneumokokkirokote, 0.5 ml) i.m. oikeaan olkavarteeseen

Nimenrix® (meningokokki ACWY -rokote, 0.5ml) i.m. oikeaan olkavarteeseen eri kohtaan

Bexsero® (meningokokki B –rokote 0,5 ml) i.m. vasempaan olkavarteeseen

Act-Hib® tai Hiberix® (hemofiilusrokote, 0.5ml) i.m. vasempaan olkavarteeseen eri kohtaan

Aikaisintaan 2 kk ensimmäisestä rokotuksesta:

Pneumovax® (23-valenttinen pneumokokkirokote) im. oikeaan olkavarteeseen

Nimenrix® (meningokokki ACWY -rokote, 0.5ml) i.m. oikeaan olkavarteeseen eri kohtaan

Bexsero® (meningokokki B –rokote 0,5 ml) i.m. vasempaan olkavarteeseen

Pernanpoistopotilaat saavat meningokokkirokotteet maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa.

Tehosteannokset

Pneumovax® tehosteannos viiden vuoden välein.

Nimenrix® tehosteannos viiden vuoden välein.

Bexsero® tehosteannoksen tarvetta ja ajoitusta ei ole vielä määritetty, suositus annetaan tutkimustiedon kertyessä.

Hemofiilusrokotusta ei tarvitse tehostaa.

**Rokotukset näitä tauteja vastaan
katsotaan hyväksi hoidoksi,
jolloin niiden kustantamisesta
vastaa hoitoyksikkö!**

Muut**Influenssa**

Pernan poisto tai toimimattomuus ei varsinaisesti vaikuta viruspuolustukseen. Influenssarokote kannattaa kuitenkin ottaa, sillä influenssan jälkitauteina saadaan herkästi bakteeritulehduksia. Pernanpoistopotilaalle ja lähipiirille kuuluu kansallisen rokotusohjelman influenssarokote, joka on maksuton.

Pernanpoistopotilaille voidaan antaa turvallisesti myös eläviä heikennettyjä rokotteita, jos henkilöllä ei ole muuta vasta-aihetta kyseiselle rokotteelle.