

Infektioidentorjuntayksikkö

SUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ

Tilanteissa, joissa tarvitaan erilaisia suojaimia, niiden asianmukainen käyttö korostuu. Tärkeää on kontaminoituneiden suojainten oikea riisumisjärjestys.

Suojainten pukeminen

1. Käsien desinfektio
2. Hengityksensuojaimen/kirurgisen suu-nenäsuojuksen pukeminen. Huom. hengityksensuojainta käyttäessä tehdään **tiivystestaus!** Katso hengityksensuojaimen pukemishohje: **Intra>Infektioidentorjunta>Varotoimet, eristysohjeet ja suojainten käyttäminen>Ilmavarotoimet> (nro 8928) [Hengityksensuojaimen](#) pukemishohje** (vaihtoehtoisesti www.khshp.fi>Ammattilainen>Sairaalahygieniaohjeet henkilöstölle> [Hengityksensuojaimen pukemishohje](#))
3. Hiussuoja/tarvittaessa kypärämallinen leikkauspäähine
4. Visiiri/suojalasit
5. Suojatakki, käsien desinfektio ja suojakäsineiden pukeminen. Käsineet tulee pukea niin, että ne ovat suojatakin päällä.

Suojainten riisuminen

1. Suojakäsineiden poisto
2. Suojatakin riisuminen
3. Käsien desinfektio
4. Visiirin poisto (nauhasta kiinni pitäen)
5. Hiussuojan poisto. Mikäli käytössä on kypärämallinen leikkauspäähine, kädet desinfioitava ennen päähineen poistoa.
6. Viimeiseksi poistetaan hengityksensuojain (nauhoista kiinni pitäen)
7. Käsien desinfektio.

K-HKS 8923.06.23
MF