

Infektioidentorjuntayksikkö

PISARAVAROTOIMET (ENT. PISARAERITYS)

Pisaraeristyksellä pyritään estämään pisaroiden (yli 5µm kokoiset hiukkaset) avulla leviävien mikro-
bien tarttuminen potilaasta toiseen ja henkilökuntaan.

Effica-paikkakartalla pisaraeristuksen yhteydessä käytetään kehysvärinä keltaista.

Pisaraeristystä edellyttävät sairaudet:	Eristysaika
Meningokokkitaudit (meningiitti, sepsis, pneumonia)	24 tuntia lääkityksen aloittamisesta
Hinkuyskä	7 päivää lääkityksen aloittamisesta
Hemofiiluksen (<i>H.influenzae</i>) aiheuttamat taudit (epiglottiitti, meningiitti, sepsis)	24 tuntia lääkityksen aloittamisesta
Kurkkumätä (difteria)	14 päivää hoidon alkamisesta tai kunnes 2 negatiivista nieluviljelyä
Sikotauti (parotiitti)	9 päivää rauhasturvotuksen alkamisesta
Vihurirokko (rubella)	7 päivää ihottuman alkamisesta
Vesikauhu (rabies)	koko hoidon ajan
Influenssa	5 päivää oireiden alusta tai viruslääkehoidon ajan kohortointi pisaravarotoimien lisäksi kosketusvarotoimet aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä
Muut hengitystieinfektioita aiheuttavat virustaudit (esim. metapneumovirus, RSV jne.)	5 päivää oireiden alusta samaa tautia sairastavien kohortointi
Koronavirus (COVID-19)	konsultoi infektio lääkäriä pisaravarotoimien lisäksi myös kosketusvarotoimet aerosoleja tuottavissa toimenpiteissä

K-HKS 8929.10.21
MF

PISARAVAROTOIMET - OVIKORTTI

Huone:	Yhden hengen huone, jossa oma WC ja suihku. Samaa tautia sairastavien kohortointi, mikäli 1HH ei ole mahdollinen ja potilaita useita
Kädet:	Käsien desinfektio, tarvittaessa vesi-saippuapesu.
Suojautuminen: koskee kaikkia ammattiryhmiä	Kertakäyttöiset suojakäsineet kun käsitellään eritteitä. Kertakäyttöinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina, kirurginen suu-nenäsuojus sekä silmäsuoja tai visiiri. Lyhyt käynti potilashuoneessa (ei kontaktia potilaaseen), esim. ruokatarjottimen vienti/hakeminen, riittää pelkkä kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttäminen ja huolellinen käsien desinfektio. Influenssa/COVID-19: aerosolille altistavissa tilanteissa (esim. intubaatio, ventilaattoripotilaan hoito), potilaan ollessa voimakasoireinen ja pidempiaikaisessa läihoidossa edellisten suojainten lisäksi hengityksensuojain (FFP2 tai FFP3 kirurgisen suu-nenäsuojuksen tilalla)
Näytteiden otto	Kirurgista suu-nenäsuojusta, hihallista esiliinaa, silmäsuojaa ja suojakäsineitä käytetään otettaessa näytteitä potilaan nielusta ja hengitysteistä.
Pyykki:	Huoneessa oma pyykkipussi.
Jätteet:	Huoneessa oma jättesäkki.
Hoitovälineet:	Huonekohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet, jotka käytön jälkeen laitetaan suoraan desinfioivaan pesukoneeseen ilman liotusta.
Ruokailu:	Normaali käytäntö.
Siivous:	Huonekohtaiset siivousvälineet ja siivousliinat. Siivouksen jälkeen siivousvälineet puhdistetaan desinfioivassa pesukoneessa. Päivittäinen ja loppusiivous: heikosti emäksinen puhdistusaine, WC- ja pesutilat Erisan Oxy+ 2% (COVID-19 erillinen ohje). Eritetahrat: Erisan Oxy+ 2%. Loppusiivouksen jälkeen huoneen desinfektio Nocosprayllä (poikkeuksena COVID-19)
Potilaan ohjaus:	Potilaalle opetetaan yskimishygieneia. Hänelle annetaan nenäliinoja ja roskapussi sekä ohjataan hyvä käsihygieneia.
Potilaan kuljettaminen:	Potilaalle kirurginen suu-nenäsuojus. Kuljettaja desinfioi kätensä ennen ja jälkeen potilaan kuljetuksen.

Influenssa: kts. lisäksi intrasta ohje Influenssaepäily ensiavussa ja osastolla nro 8942
Koronavirus (COVID-19): kts. lisäksi intrasta ohje Koronavirus (COVID-19) potilaan (epäily/varmistunut) hoito K-HKS:ssa nro 8657

Toimintaohje ympärivuorokautista hoitoa/hoivaa antaviin yksiköihin koronavirus-tartunnan (COVID-19) ehkäisemiseksi www.khshp.fi